

RECTAS TANGENTES (Resumen)

- Para hallar **la tangente a $y = f(x)$ en el punto $x = a$** :
 - Hallamos $f(a)$. El punto de tangencia es $(a, f(a))$.
 - Hallamos $f'(a)$. La pendiente de la tangente es $m = f'(a)$.
 - Se escribe la ecuación de la recta tangente en forma punto-pendiente:
$$y - f(a) = f'(a) \cdot (x - a)$$
- Para hallar la **tangente a $y = f(x)$ cuando nos dan la pendiente** de dicha tangente (nos la dan directamente o nos dicen que es paralela a otra recta):
 - Hallamos $f'(x)$ y lo igualamos a la pendiente que nos dan. Las soluciones son las abscisas del punto de tangencia. Puede haber más de una solución.
 - Hallamos las ordenadas de los puntos de tangencia, sustituyendo los valores de x resultantes del paso anterior en $y = f(x)$.
 - Se escribe la ecuación de la recta tangente en forma punto-pendiente para cada uno de los puntos hallados (la pendiente es la misma en todas las soluciones; es la que nos dieron en el enunciado):
$$y - f(a) = m \cdot (x - a)$$
- Para hallar la **tangente a $y = f(x)$ que pase por un punto determinado que no es de la gráfica** de la función:
 - Se halla la fórmula de $f'(x)$.
 - Se obliga a que la tangente $y - f(a) = f'(a) \cdot (x - a)$ pase por el punto que nos dan (se sustituyen las coordenadas del punto en x y en y , dejando a sin sustituir; tener en cuenta que hay que poner la fórmula obtenida de $f'(x)$ en función de a).
 - Queda una ecuación donde la incógnita es a . Se resuelve y de ahí se averigua la abscisa del punto de tangencia (puede haber más de una solución).
 - Para cada una de las soluciones de a , se averigua su ordenada $f(a)$ y la pendiente $f'(a)$, y se escribe la tangente: $y - f(a) = f'(a) \cdot (x - a)$.
- La **normal** es la perpendicular a la tangente en el punto de tangencia. Se utiliza la ecuación punto-pendiente con las coordenadas de dicho punto de tangencia, pero con pendiente $m' = -1/m$, donde $m = f'(a)$: $y - f(a) = m' \cdot (x - a)$